Le 22 Xbre 1768.

n° 87

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

hôe sans cuisses

Par M. Bertin, Eleve de Bicêtre

nous trouvons dans beaucoup d'observateurs differentes histoires de monstres, et de sujets qui sans meriter le nom, presentoient neanmoins des variations extraordinaires tant dans la situation que dans le nombre le volume et la ~~la figure~~ ~~situation~~ figure des parties. mais il y en a peu qui se soient donnés la peine de nous instruire de la structure des parties monstrueuses qu'ils nous ont decrites. peut etre parce qu'ils n'ont pas toujours eu occasion de les examiner, ou parce qu'ils ont cru avec assés de fondement que les sortes d'observations n'étant que des bisareries de la nature et ne pouvant nous eclairer ni du coté de la phisiologie, et encore moins du coté de la pathologie, surtout quand ce ne sont pas des parties vitalles, etoient plus curieuses qu'utilles.

quoique mon observation n'ait paru etre de ce nombre j'ai cru neanmoins [illegible] seroit pas faché d'en voir le detail et d'en examiner les pieces

Le trois decembre mil sept cent soixante huit, j'eus occasion d'examiner le cadavre d'un homme âgé de vingt ans fort maigre, et qui dés sa naissance avoit eu les jambes implantées dans les aînes sans aucune apparence de cuisses, n'avoit que le testicule droit point de verge apparente, le bassin extremement etroit; et ayant d'ailleurs le tronc la tête et les extremités supperieures conformés comme elles le devoient etre dans un homme de son âge, excepté qu'il avoit l'epine contourné du coté gauche.

cet homme avoit toujour été imbecille, n'avoit jammais articulé que quelques mots quoi qu'il entendit bien et qu'il eut tous les mouvemens de la langue bien libres. il n'avoit jammais pû marcher et ne se soutenoit point sur ses jambes quoi qu'il les fit agir en differens sens; parvenu a l'âge de puberté, le bout de verge qu'il avoit et qui etoit de la grandeur d'un clitoris ordinaire, entroit en erection quand il voioit quelques femmes qui lui plaisoient; les fonctions naturelles et animalles se firent toujour assés bien jusqu'à la maladie dont il est mort, qui etoit une fievre putride qui lui dura quatre jours.

ARC 26 n° 76

a lexamen du Cadavre je trouvai le bassin beaucoup plus petit qu'à lordinaire et les os fort minces, il avoit 4 pouces de longueur depuis les sacrum jusqu'à lextremité du coccix, et 7 a 8 pouces depuis le bord supperieure de lilleum jusqu'à lespine de lischium du coté droit, et 6 a 7 pouces du coté gauche, la ligne qui distingue le grand d'avec le petit bassin etoit fort basse et mieux marquée du coté gauche; lilleum droit etoit plus haut que le gauche et moins evasé en arriere, de manniere quil formoit anterieurement un angle droit avec los sacrum, le gauche au contraire etoit si renversé en arriere quil ne decrivoit avec los sacrum qu'une ligne legerement courbe, lischium du meme coté ainsi que le pubis se portoit aussi plus exterieurement et etoit plus bas que du coté droit; les trous ovalaires etoient plus considerables que le volume des os ne sembloit le permettre, et etoient tout a fait en devant, parceque les branches des deux pubis etoient plus ~~rapprochées~~ écartées l'une de lautre quelles ne le sont ordinairement, il n'y avoit point de cavité cotiloïde ni d'un coté ni de lautre; il n'y avoit aucune apparence de femur du coté droit, il y avoit une jambe formée par un tibia seulement, de figure a peu près ordinaire, et dont lextremité supperieure formoit une grosse pointe irreguliere a la circonference de laquelle s'implantoient les muscles ordinaires de la cuisse qui ne varioient que dans leur attache inferieure; mais ceux [illegible] manquoient; lextremité de cette pointe etoit articulée par un lig[illegible] capsulaire assés fort a un autre ligament plat et large qui se trouvoit sur une facette platte située a la partie anterieure et inferieure de lilleum; le tibia avoit pouces de longueur n'avoit rien dextraordinaire a sa partie inferieure et etoit recouvert des muscles du pied, auquel je n'ai remarqué que ~~quatre~~ deux doigts bien formés et deux os du metatarse

a legard du coté gauche il y avoit un femur dont lextremité supperieure se confondoit avec la partie inferieure et anterieure de lilleum; il suivoit ensuite les contours de lischium, se terminoit a 3 pouces au dessous de cet os par deux condiles entre lesquels etoit une espece de poulie cartillagineuse pour larticulation de ce femur avec la jambe gauche qui n'etoit aussi formée 69
que du tibia, ce femur etoit doué de tous ses muscles mais qui etoient extremement petits et grêles, il etoit aussi recouvert des muscles ~~propres~~ de la jambe.

il y avoit une petite rotule située posterieurement, un ~~autre~~ petit tubercule osseux et mobile situé posterieurement a lendroit de l'union du femur a lilleum et un second a la partie anterieure et supperieure du corps de lischium, ce dernier faisoit corps avec los. le tibia de ce meme coté ne presentoit rien dextraordinaire, excepté quil etoit contourné en dehors.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE